РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 879/2010 НА КОМИСИЯТА

от 6 октомври 2010 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 554/2008 на Комисията по отношение на минималното съдържание на 6-фитаза (Quantum Phytase) като фуражна добавка за кокошки носачки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните ([1]), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1) Използването на 6-фитаза (ЕС 3.1.3.26) (Quantum Phytase) като фуражна добавка за пилета за угояване, кокошки носачки, патици за угояване, пуйки за угояване и отбити прасенца беше разрешено с Регламент (ЕО) № 554/2008 на Комисията от 17 юни 2008 г. относно разрешително за 6-фитаза (ЕС 3.1.3.26) (Quantum Phytase) като фуражна добавка ([2]).

(2) Притежателят на разрешителното подаде заявление в съответствие с член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, в което отправя искане за промяна на условията на разрешителното за посочената фуражна добавка, когато се използва за кокошки носачки, с цел намаляване на минималната препоръчителна доза на 6-фитаза (ЕС 3.1.3.26) (Quantum Phytase) от 2 000 FTU/kg на 250 FTU/kg. Посоченото заявление беше придружено от съответните данни в подкрепа на искането за промяна.

(3) В становището си от 10 март 2010 г. Европейският орган за безопасност на храните достигна до заключението, че добавката 6-фитаза (ЕС 3.1.3.26) (Quantum Phytase) е ефикасна при кокошки носачки в исканата минимална доза от 250 FTU/kg пълноценен фураж ([3]).

(4) Предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия са изпълнени.

(5) Поради това Регламент (ЕО) № 554/2008 следва да бъде съответно изменен.

(6) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 554/2008 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 октомври 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO

([1]) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.
([2]) ОВ L 158, 18.6.2008 г., стр. 14.
([3]) EFSA Journal 2010 г.; 8(3):1550.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешителното	Добавка (търговско наименование)	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешителното
						Единици за активност/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория зоотехнически добавки. Функционална група: подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната									
„4a5	AB Enzymes GmbH	6-фитаза EC 3.1.3.26 (Quantum Phytase 2500 D (Quantum Phytase 5000 D	*Състав на добавката:* препарат от 6-фитаза, получена от *Pichia pastoris* (*DSM 15927*), с минимална активност: в твърдо състояние: 2 500 FTU (1)/g в течно състояние: 5 000 FTU/ml *Характеристика на активното вещество* 6-фитаза, получена от *Pichia pastoris (DSM 15927)* *Аналитичен метод* (2) Колориметричен метод на базата на реакцията на ванадомолибдат с органичен фосфат, получен при реакцията с фитат-съдържащ субстрат (натриев фосфат) при pH 5,5 и 37 °C.	Пилета за угояване	—	500 FTU	—	1. В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочи температурата на съхранение, срокът на годност и устойчивостта на гранулиране. 2. Препоръчителна доза за килограм пълноценен фураж: — пилета за угояване: 500—2 500 FTU; — кокошки носачки: 250 FTU; — патици за угояване: 250—2 000 FTU; — пуйки за угояване: 1 000—2 700 FTU; — прасенца (отбити): 100—2 500 FTU. 3. Да се използва в хранителни смески, съдържащи повече от 0,25 % фосфор, свързан с фитин. 4. Да се използва при отбити прасенца до достигане на тегло от приблизително 35 kg. 5. Мерки за безопасност: носене на предпазна (дихателна) маска, предпазни очила и ръкавици по време на работа.	8.7.2018 г.
				Кокошки носачки	—	250 FTU	—		
				Патици за угояване	—	250 FTU	—		
				Пуйки за угояване	—	1 000 FTU	—		
				Прасенца (отбити)	—	100 FTU	—		

(1) 1 FTU е количеството ензим, което освобождава 1 микромол неорганичен фосфат от натриев фитат на минута при pH 5,5 и температура 37 °C.
(2) Подробна информация относно методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория на Общността: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives“